

滤纸酶 (Filter paper Activity, FPA) 试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义:

纤维素酶是由微生物产生的多组分的酶系,能水解纤维素 β -1,4 葡萄糖苷键生成葡萄糖,研究滤纸酶活力对纤维素酶的研究具有非常重要的意义。

测定原理:

滤纸酶水解滤纸产生的还原糖能与 3,5-二硝基水杨酸生成红棕色氨基化合物,在 540nm 处有最大光吸收,在一定范围内反应液颜色深浅与还原糖的量成正比,可测定计算得滤纸酶的活力。

组成:

产品名称	GMS062-50T/24S	Storage
试剂一: 液体	15ml	4°C
试剂二: 液体	40ml	4°C
滤纸条	50mg×50 条	--
说明书	一份	

自备仪器和用品:

天平、研钵、低温离心机、可见分光光度计、1 ml 玻璃比色皿、恒温水浴锅。

酶液提取:

1. 组织: 按照质量 (g) : 蒸馏水体积(ml)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g, 加入 1ml 蒸馏水) 加入蒸馏水, 冰浴匀浆后于 4°C, 12000rpm 离心 10min, 取上清置于冰上待测。
2. 细胞: 按照细胞数量 (10^4 个) : 蒸馏水体积 (ml) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细胞加入 1ml 提取液), 冰浴超声波破碎细胞 (功率 300w, 超声 3 秒, 间隔 7 秒, 总时间 3min); 然后 4°C, 12000rpm 离心 10min, 取上清置于冰上待测。
3. 培养液或其它液体: 直接检测。

测定操作:

1. 根据样本数量取两倍数量的滤纸条和 Ep 管, 每支 Ep 管中放入一个卷状滤纸条 (注意要放入底部), 作为底物。
2. 对照管: 取 200 μ l 灭活的酶液, 加入 500 μ l 试剂一, 充分混匀, 再加入放有滤纸条的 Ep 管中, 标注为

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司, 保留一切权利



对照管。

3. 测定管：取 200 μ l 酶液，加入 500 μ l 试剂一，充分混匀，再加入放有滤纸条的 Ep 管中，标注为测定管。
4. 对照管和测定管同时置于 50 $^{\circ}$ C 水浴锅中反应 30min。
5. 加入 800 μ l 试剂二，沸水浴 5min，自来水冷却后取 1ml 于 1ml 玻璃比色皿中测定 540nm 处吸光值，分别记为 A 对照管和 A 测定管。

酶活性计算公式：

标准曲线： $y = 0.2805x - 0.0255$ ， $R^2 = 0.9991$

(1) 按照蛋白浓度计算

酶活性定义：在 50 $^{\circ}$ C，pH4.6 条件下，每毫克蛋白每分钟分解滤纸产生 1mg 葡萄糖所需的酶量为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{FPA (U/mg prot)} &= (\Delta A + 0.0255) \div 0.2805 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T \\ &= 0.891 \times (\Delta A + 0.0255) \div C_{\text{pr}} \end{aligned}$$

(2) 按照样本质量计算

酶活性定义：在 50 $^{\circ}$ C，pH4.6 条件下，每克组织每分钟分解滤纸产生 1mg 葡萄糖所需的酶量为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{FPA (U/g 鲜重)} &= (\Delta A + 0.0255) \div 0.2805 \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 0.891 \times (\Delta A + 0.0255) \div W \end{aligned}$$

(3) 按液体体积计算

酶活性定义：在 50 $^{\circ}$ C，pH4.6 条件下，每毫升培养液每分钟分解滤纸产生 1mg 葡萄糖所需的酶量为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{FPA (U/ml)} &= (\Delta A + 0.0255) \div 0.2805 \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div T \\ &= 0.891 \times (\Delta A + 0.0255) \end{aligned}$$

(4) 按细胞数量计算

酶活性定义：在 50 $^{\circ}$ C，pH4.6 条件下，每 10⁴ 个细胞每分钟分解滤纸产生 1mg 葡萄糖所需的酶量为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{FPA (U/10}^4\text{cell)} &= (\Delta A + 0.0255) \div 0.2805 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times \text{细胞数量 (万个)} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 0.891 \times (\Delta A + 0.0255) \div \text{细胞数量 (万个)} \end{aligned}$$

V 反总：反应总体积，1.5ml，V 样：反应体系中加入样本体积，0.2ml；V 样总：加入提取液体积，1ml；Cpr：样本蛋白浓度，mg/ml；W：样本质量，g；T：反应时间，30min

注意事项：

1. 用干净的镊子取出滤纸条，带手套卷成卷放入 Ep 管底部。
2. 样本灭活时保证同一批样本处理时间一致，建议沸水浴十分钟。
3. 批量样本测定之前先做 1-2 个样本的预实验，若吸光值超过 1.2，建议将样本用蒸馏水稀释后再进行测定，计算公式中乘以稀释倍数。
4. 显色后取检测液时注意枪头不要碰到滤纸条，以免带入毛状物，影响测定结果。

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利

