

植酸酶 (phytase) 试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义:

植酸酶 (phytase) 是催化植酸及其盐类水解为肌醇与磷酸 (盐) 的一类酶的总称, 属磷酸单酯水解酶, 它能将食品和饲料中植酸及其盐转化为可供有机体利用的有效磷, 降低粪便中的磷含量, 减轻对环境的污染, 改善营养成分的吸收和利用, 因此具有极其广泛的研究和应用价值。

测定原理:

植酸酶在一定温度和 pH 值条件下, 水解底物植酸钠生成无机磷与肌醇衍生物, 无机磷在酸性环境中与钼酸铵显色剂反应生成蓝色复合物, 在 700nm 处有特征吸收峰, 根据 700nm 处吸光值变化可计算得植酸酶活性。

试剂组成和配制:

产品名称	OT028-50T/24S	Storage
提取液: 液体	50ml	4°C
缓冲液: 碱性提取液	25ml	4°C
试剂一: 粉剂	1 瓶	4°C
试剂二: 液体	25ml	4°C
显色剂: 粉剂	6 瓶	4°C
说明书	一份	

试剂一: 粉剂×1 瓶, 4°C 保存, 临用前加缓冲液 10ml 配制, 现用现配; 用不完的试剂 4°C 保存一个月。
显色剂: 粉剂×6 瓶, 4°C 保存, 临用前根据用量每瓶加 1ml 双蒸水溶解, 再加 4ml 试剂二混匀。

需自备仪器和用品:

天平、低温离心机、可见分光光度计、1 ml 玻璃比色皿、恒温水浴锅, 超声溶解器, 回旋式振荡器。

样本处理:

1. 酶制剂: 按照质量 (g) : 提取液体积(ml)为 1: 500~1000 的比例 (建议称取约 0.001g, 加入 1ml 提取液) 加入提取液, 在超声波溶解器上溶解 15min, 再用回旋式振荡器振荡 15min, 待测。



2. 组织：按照质量 (g) : 提取液体积(ml)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g, 加入 1ml 提取液) 进行冰浴匀浆, 在超声波溶解器上溶解 15min, 再用回旋式振荡器振荡 15min, 4°C, 4000g 离心 10min, 取上清待测。

3. 饲料样品：饲料烘干粉碎, 过 40 目筛, 按照质量 (g) : 提取液体积(ml)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g, 加入 1ml 提取液) 进行冰浴匀浆, 在超声波溶解器上溶解 15min, 再用回旋式振荡器振荡 15min, 4°C, 4000g 离心 10min, 取上清待测。

4. 培养液等液体样品, 混匀直接测定。

测定步骤:

试剂名称(μl)	对照管	测定管
样本 (μl)	100	100
37°C温育 5min		
缓冲液 (μl)	400	
试剂一 (μl)		400
混匀, 37°C温育 30min, 95°C, 10min 终止反应, 冷却至室温		
显色剂 (μl)	500	500

混匀, 37°C静置 15min, 10000g, 室温, 离心 5min, 取上清, 蒸馏水调零, 测定 700nm 处吸光值, $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管设一个对照管。

注意事项

1、显色剂需要临用前根据用量配制, 每一瓶是 10 个样本的用量, 新配制的显色剂若有颜色则已经污染或者试剂过期, 应放弃使用。

2、 ΔA 线性范围为 0.01-2。

酶活性计算公式:

(一) NADP⁺含量的计算

标准曲线: $y = 0.2764x + 0.0082$, $R^2 = 0.9998$; x 为标准品浓度 ($\mu\text{mol/ml}$), y 为吸光值。

按照蛋白浓度计算

酶活性定义: 在 37°C, pH5.5 的条件下, 每毫克蛋白每分钟从 5mmol/L 的植酸钠溶液中释放出 1 μmol 的无机磷为一个酶活力单位。

植酸酶活性 ($\mu\text{mol/min/mg prot}$) = $(\Delta A - 0.0082) \div 0.2764 \div C_{\text{pr}} \div T = 0.1206 \times (\Delta A - 0.0082) \div C_{\text{pr}} \div T$ 。按照样本质量计算

酶活性定义: 在 37°C, pH5.5 的条件下, 每克样本每分钟从 5mmol/L 的植酸钠溶液中释放出 1 μmol 的无机磷为一个酶活力单位。

植酸酶活性 ($\mu\text{mol/min/g 鲜重}$) = $(\Delta A - 0.0082) \div 0.2764 \div W \div T = 0.1206 \times (\Delta A - 0.0082) \div W \div T$

3. 培养液等液体样品

酶活性定义: 在 37°C, pH5.5 的条件下, 每毫升液体每分钟从 5mmol/L 的植酸钠溶液中释放出 1 μmol 的无机磷为一个酶活力单位。

植酸酶活性 ($\mu\text{mol/min/ml}$) = $(\Delta A - 0.0082) \div 0.2764 \div T = 0.1206 \times (\Delta A - 0.0082) \div T$

C_{pr} : 样本蛋白含量, mg/ml; W : 样本质量, g; T : 反应时间, 30min。

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司, 保留一切权利

